



Parque Nacional Nahuel Huapi

Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi

San Martín 24 - R8400ALN - Tel.: +54 (0294) 4423111
S.C. de Bariloche - Argentina

Departamento Conservación y Educ. Ambiental - División Educación Ambiental

www.nahuelhuapi.gov.ar

Referencias

Medida

AMBIENTES:

altoandino

bosque

estepa

acuático

ríos de montaña

ALIMENTACIÓN:

insectos / otros invertebrados

roedores / otros vertebrados

peces semillas / granos

carroña néctar

frutos crustáceos

hierbas y gramíneas

¡Si lo ves avisanos!

Amenazadas

Migratorias

1 Meses en que se puede observar dentro del PN

Equipo para la observación de aves:

Para que la observación de aves sea provechosa se necesitarán estos elementos: prismáticos o binoculares, libreta de campo y una guía para la identificación de aves de la zona, región o país.



60 cm.

Nada semisumergido y bucea. Se posa en rocas. Nidifica en colonias en acantilados del lago Nahuel Huapi. Vuela en línea recta sobre la superficie del agua, con aleteo rápido y continuo. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Cormorán imperial
(BLUE-EYED CORMORANT)
Phalacrocorax atriceps



44 cm.

Zambulle y bucea. Cuando nada es muy visible por su gran tamaño (el mayor de los macaés). Transporta sus pichones en la espalda. Emite vocalización fantasmagórica audible a gran distancia: "uuuaa". Plumaje invernal más apagado. Pichones y juveniles listados. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Huala
(GREAT GREBE)
Podiceps major



28cm.

Zambulle, bucea y nada como los demás macaés. Silencioso. Se esconde entre los juncos. En el Parque Nacional prefiere lagunas y bahías reparadas con abundante vegetación en las orillas. Pichones y juveniles listados. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital

Macá pico grueso
(PIED-BILLED GREBE)
Podilymbus podiceps



43 cm.

Es crepuscular y nocturna pero a veces se alimenta de día escondida entre el follaje denso de los árboles. Vuela lento y pausado. Fuerte vocalización "kuac". Juveniles pardos con manchas blancas. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital

Garza bruja
(BLACK-CROWNED NIGHT HERON)
Nycticorax nycticorax



57 cm.

Terrestre, caminadora y confiada. Se alimenta en el suelo hundiendo su pico. Se posa y nidifica en árboles, acantilados y techos. Muy ruidosa. Grito estridente como "bocina". Parte de la población migra. También se alimenta de lombrices y pequeños vertebrados. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Bandurria austral
(BLACK-FACED IBIS)
Theristicus melanopis



95 cm.

Muy planeador, vuela en círculos amplios a gran altura. Estrictamente carroñero. Punta de las alas como "dedos separados". Envergadura 3 m. Macho: con cresta y mayor tamaño. Hembra: sin cresta - Juvenil: Pardo sin blanco.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital

Cóndor andino
(ANDEAN CONDOR)
Vultur gryphus



53 cm.

Confiado. Silencioso. Vuelo planeado con vigorosos aleteos. Se los ve generalmente en grupos, a veces posados sobre árboles y postes. Estrictamente carroñero. Envergadura 1,40 m. Manchas blancas en las alas visibles cuando vuela. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña

Jote cabeza negra
(BLACK VULTURE)
Coragyps atratus



53 cm.

Confiado. Terrestre pero a veces nada. En otoño e invierno forma grandes bandadas, a veces con el cauquén común. Se desplazan volando, a veces grandes distancias. Parte de la población migra. El macho es más grande que la hembra y de colores más vivos.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Cauquén real
(ASHY-HEADED GOOSE)
Chloephaga poliocephala



33 cm.

Nada en aguas poco profundas. Es posible verlo en la costa descansando. En grupos pequeños, a veces con otros patos (maicero y overo). También se alimenta filtrando invertebrados en el agua y entre la vegetación de la orilla. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital

Pato barcino
(SPECKLED TEAL)
Anas flavirostris



40 cm.

Nada en aguas poco profundas. Descansa en orillas y piedras de la costa, a veces por largos periodos. En general se lo observa en pareja. Se alimenta también de invertebrados y plantas acuáticas. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Pato de anteojos
(SPECTACLED DUCK)
Specularia specularis



30 cm.

Desconfiado. Se posa en rocas emergentes de ríos y arroyos de montaña. Nada contra la corriente, se zambulle y bucea en busca de su alimento. Vuela bajo siguiendo los cursos de los ríos. Hembra gris y anaranjada. Los machos pueden diferenciarse entre sí por sus marcas en la cara.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Pato de los torrentes
(TORRENT DUCK)
Merganetta armata



65 cm.

Corpulento. Nada y bucea, raramente vuela. Descansa en piedras y rocas emergentes. Durante la época reproductiva es territorial y agresivo. En general se lo observa en pareja todo el año. Sexos diferente color. Macho pico anaranjado y hembra pico grisáceo.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Quetro volador
(FLYING STEAMER-DUCK)
Tachyeres patachonicus



♂ 60 cm.
♀ 70 cm.

Muy planeadora. Silueta en vuelo triangular. Se posa en árboles con escaso follaje, en postes o grandes rocas. Es la mayor de las rapaces diurnas del Parque Nacional. Juvenil acanelado y barrado de pardo.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña

Águila mora
(BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE)
Geranoaetus melanoleucus



♂ 45 cm.
♀ 53 cm.

Planea a gran altura, a veces en grandes círculos. Vuela entre los árboles. Escasos registros en el Parque Nacional. Posee una fase de coloración oscura (negruzca). Es fácilmente confundible con otros aguiluchos. Sexos iguales. Juvenil con garganta y centro pectoral blancos.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa

Aguilucho cola rojiza
(RUFUS-TAILED HAWK)
Buteo ventralis



55 cm.

Terrestre y confiado. Se posa sobre árboles y postes. Cuando vuela, a veces es atacado por otras aves. Juvenil del mismo tamaño que el adulto pero color pardo estriado de pardo oscuro. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña

Carancho
(SOUTHERN CRESTED-CARACARA)
Caracara plancus



37cm.

Confiado. Terrestre y caminador. Se posa en lugares visibles. Se lo ve solitario o en parejas. A menudo en rutas comiendo carroña. Chillido ruidoso. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


foto: Demián Belmonte

Chimango
(CHIMANGO CARACARA)
Milvago chimango



♂ 25 cm.
♀ 28 cm.

Vuela rápido, también "halcenea" (vuelo suspendido para localizar a sus presas). Se posa en las ramas superiores de árboles y postes. Es la más pequeña de las rapaces diurnas del Parque Nacional. Juvenil similar a la hembra. Hembra: Sin gris en las alas.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa

Halconcito colorado
(AMERICAN KESTREL)
Falco sparverius



31 cm.

Terrestre, se alimenta en el suelo. Generalmente en parejas. Muy territorial y agresivo cuando defiende el nido. Grito estridente en señal de alarma. Parte de la población migra en invierno. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


foto: Demián Belmonte

Tero común
(SOUTHERN LAPWING)
Vanellus chilensis



55 cm.

Confiada. Buena planeadora. Vuela detrás de las embarcaciones. Se posa en piedras emergentes, postes y muelles. A veces flota en el agua. Juvenil blanquizco manchado de pardo. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Gaviota cocinera
(KELP GULL)
Larus dominicanus



34 cm.

Silenciosa y arisca. Solitaria o en bandadas poco numerosas. Es común observarla alimentándose en el suelo. Línea blanca en la nuca, juveniles sin esa marca. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña

Paloma araucana
(ARAUCANIAN PIGEON)
Columba araucana



31 cm.

Confiada. Ruidosa. Vuela rápido y a baja altura. Se alimenta en árboles y en el suelo. También come brotes y pétalos. La población tiene movimientos altitudinales. En invierno forma grandes bandadas. Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte

Cachaña
(AUSTRAL PARAKEET)
Enicognathus ferrugineus



38 cm.

Nocturna. De día descansa escondida en los árboles. Difícil de observar. Llamativa vocalización semejante a la de un mono. Entre sus presas predomina el roedor colilargo (transmisor de Hantavirus). Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña

Lechuza bataraz o Concón
(RUFUS-LEGGED OWL)
Strix rufipes



50 cm.

Confiado. Crepuscular y nocturno. No muy oculto. Durante el día se posa en árboles o grandes rocas. Su nombre se debe a la onomatopeya de su vocalización, "tucu-quere". Notables "orejas". Sexos iguales.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa

Tucúquere
(MAGELLANIC HORNED OWL)
Bubo magellanicus