



Parque Nacional Nahuel Huapi

Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi

San Martín 24 - R8400ALN - Tel.: +54 (0294) 4423111
S.C. de Bariloche - Argentina

Departamento Conservación y Educ. Ambiental - División Educación Ambiental

www.nahuelhuapi.gov.ar


Referencias

Medida	ALIMENTACIÓN:
AMBIENTES:	insectos / otros invertebrados
altoandino	roedores / otros vertebrados
bosque	peces semillas / granos
estepa	carriona néctar
acuático	frutos crustáceos
ríos de montaña	hierbas y gramíneas
¡Si lo ves avisanos!	Amenazadas Migratorias

1 Meses en que se puede observar dentro del PN

Equipo para la observación de aves:

Para que la observación de aves sea provechosa se necesitarán estos elementos: prismáticos o binoculares, libreta de campo y una guía para la identificación de aves de la zona, región o país.



60 cm.

Nada semisumergido y bucea. Se posa en rocas. Nidifica en colonias en acantilados del lago Nahuel Huapi. Vuela en línea recta sobre la superficie del agua, con aleteo rápido y continuo. Sexos iguales.



Cormorán imperial
(BLUE-EYED CORMORANT)
Phalacrocorax atriceps

foto: Demián Belmonte



43 cm.

Es crepuscular y nocturna pero a veces se alimenta de día escondida entre el follaje denso de los árboles. Vuela lento y pausado. Fuerte vocalización "kuac". Juveniles pardos con manchas blancas. Sexos iguales.



Garza bruja
(BLACK-CROWNED NIGHT HERON)
Nycticorax nycticorax

foto: Facundo Vital



28cm.

Zambulle, bucea y nada como los demás macaés. Silencioso. Se esconde entre los juncos. En el Parque Nacional prefiere lagunas y bahías reparadas con abundante vegetación en las orillas. Pichones y juveniles listados. Sexos iguales.



Macá pico grueso
(PIED-BILLED GREBE)
Podilymbus podiceps

foto: Facundo Vital



95 cm.

Muy planeador, vuela en círculos amplios a gran altura. Estrictamente carroñero. Punta de las alas como "dedos separados". Envergadura 3 m. Macho: con cresta y mayor tamaño. Hembra: sin cresta - Juvenil: Pardo sin blanco.



Cóndor andino
(ANDEAN CONDOR)
Vultur gryphus

foto: Facundo Vital



53 cm.

Confiado. Silencioso. Vuelo planeado con vigorosos aleteos. Se los ve generalmente en grupos, a veces posados sobre árboles y postes. Estrictamente carroñero. Envergadura 1,40 m. Manchas blancas en las alas visibles cuando vuela. Sexos iguales.



Jote cabeza negra
(BLACK VULTURE)
Coragyps atratus

foto: Mariano Diez Peña



57 cm.

Terrestre, caminadora y confiada. Se alimenta en el suelo hundiendo su pico. Se posa y nidifica en árboles, acantilados y techos. Muy ruidosa. Grito estridente como "bocina". Parte de la población migra. También se alimenta de lombrices y pequeños vertebrados. Sexos iguales.



Bandurria austral
(BLACK-FACED IBIS)
Theristicus melanopus

foto: Demián Belmonte



33 cm.

Nada en aguas poco profundas. Es posible verlo en la costa descansando. En grupos pequeños, a veces con otros patos (maicero y overo). También se alimenta filtrando invertebrados en el agua y entre la vegetación de la orilla. Sexos iguales.



Pato barcino
(SPECKLED TEAL)
Anas flavirostris

foto: Facundo Vital



40 cm.

Nada en aguas poco profundas. Descansa en orillas y piedras de la costa, a veces por largos periodos. En general se lo observa en pareja. Se alimenta también de invertebrados y plantas acuáticas. Sexos iguales.



Pato de anteojos
(SPECTACLED DUCK)
Specularia specularis

foto: Demián Belmonte



30 cm.

Desconfiado. Se posa en rocas emergentes de ríos y arroyos de montaña. Nada contra la corriente, se zambulle y bucea en busca de su alimento. Vuela bajo siguiendo los cursos de los ríos. Hembra gris y anaranjada. Los machos pueden diferenciarse entre sí por sus marcas en la cara.



Pato de los torrentes
(TORRENT DUCK)
Merganetta armata

foto: Demián Belmonte



65 cm.

Corpulento. Nada y bucea, raramente vuela. Descansa en piedras y rocas emergentes. Durante la época reproductiva es territorial y agresivo. En general se lo observa en pareja todo el año. Sexos diferente color. Macho pico anaranjado y hembra pico grisáceo.



Quetro volador
(FLYING STEAMER-DUCK)
Tachyeres patachonicus

foto: Demián Belmonte



♂ 60 cm.
♀ 70 cm.

Muy planeadora. Silueta en vuelo triangular. Se posa en árboles con escaso follaje, en postes o grandes rocas. Es la mayor de las rapaces diurnas del Parque Nacional. Juvenil acanelado y barrado de pardo.



Águila mora
(BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE)
Geranoaetus melanoleucus

foto: Mariano Diez Peña



♂ 45 cm.
♀ 53 cm.

Planea a gran altura, a veces en grandes círculos. Vuela entre los árboles. Escasos registros en el Parque Nacional. Posee una fase de coloración oscura (negruzca). Es fácilmente confundible con otros aguiluchos. Sexos iguales. Juvenil con garganta y centro pectoral blancos.



Aguilucho cola rojiza
(RUFUS-TAILED HAWK)
Buteo ventralis

foto: Mariano Costa



55 cm.

Terrestre y confiado. Se posa sobre árboles y postes. Cuando vuela, a veces es atacado por otras aves. Juvenil del mismo tamaño que el adulto pero color pardo estriado de pardo oscuro. Sexos iguales.



Carancho
(SOUTHERN CRESTED-CARACARA)
Caracara plancus

foto: Mariano Diez Peña



37cm.

Confiado. Terrestre y caminador. Se posa en lugares visibles. Se lo ve solitario o en parejas. A menudo en rutas comiendo carroña. Chillido ruidoso. Sexos iguales.



Chimango
(CHIMANGO CARACARA)
Milvago chimango

foto: Demián Belmonte



♂ 25 cm.
♀ 28 cm.

Vuela rápido, también "halcenea" (vuelo suspendido para localizar a sus presas). Se posa en las ramas superiores de árboles y postes. Es la más pequeña de las rapaces diurnas del Parque Nacional. Juvenil similar a la hembra. Hembra: Sin gris en las alas.



Halconcito colorado
(AMERICAN KESTREL)
Falco sparverius

foto: Mariano Costa



31 cm.

Terrestre, se alimenta en el suelo. Generalmente en parejas. Muy territorial y agresivo cuando defiende el nido. Grito estridente en señal de alarma. Parte de la población migra en invierno. Sexos iguales.



Tero común
(SOUTHERN LAPWING)
Vanellus chilensis

foto: Demián Belmonte



55 cm.

Confiada. Buena planeadora. Vuela detrás de las embarcaciones. Se posa en piedras emergentes, postes y muelles. A veces flota en el agua. Juvenil blanquizco manchado de pardo. Sexos iguales.



Gaviota cocinera
(KELP GULL)
Larus dominicanus

foto: Demián Belmonte



34 cm.

Silenciosa y arisca. Solitaria o en bandadas poco numerosas. Es común observarla alimentándose en el suelo. Línea blanca en la nuca, juveniles sin esa marca. Sexos iguales.



Paloma araucana
(ARAUCANIAN PIGEON)
Columba araucana

foto: Mariano Diez Peña



31 cm.

Confiada. Ruidosa. Vuela rápido y a baja altura. Se alimenta en árboles y en el suelo. También come brotes y pétalos. La población tiene movimientos altitudinales. En invierno forma grandes bandadas. Sexos iguales.



Cachaña
(AUSTRAL PARAKEET)
Enicognathus ferrugineus

foto: Demián Belmonte



38 cm.

Nocturna. De día descansa escondida en los árboles. Difícil de observar. Llamativa vocalización semejante a la de un mono. Entre sus presas predomina el roedor colilargo (transmisor de Hantavirus). Sexos iguales.



Lechuza bataraz o Concón
(RUFUS-LEGGED OWL)
Strix rufipes

foto: Mariano Diez Peña



50 cm.

Confiado. Crepuscular y nocturno. No muy oculto. Durante el día se posa en árboles o grandes rocas. Su nombre se debe a la onomatopeya de su vocalización, "tucú-quere". Notables "orejas". Sexos iguales.



Tucúquere
(MAGELLANIC HORNED OWL)
Bubo magellanicus

foto: Mariano Costa



Caburé grande
(PYGMY OWL)
Glaucidium nanum

19 cm.

Solitario. Diurno y nocturno. Vocalización monótona y prolongada: hu hu hu hu... Ocasionalmente se alimentan de aves. Dos manchas negras con bordes blancos que aparentan ojos en la nuca. Existen variantes en el plumaje color gris y rojizo. Hembra un poco más grande que el macho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: COA Tintica



Picaflor rubí
(GREE-BACKED FIRECROWN)
Sephanoides sephanioides

9 cm.

Muy inquieto. Vuela rápido. Se sujeta a las flores para libar. Chirrido agudo, trinado y continuo. Es el principal polinizador del bosque andino patagónico. Hembra con corona verde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Martín pescador grande
(RINGED KINGFISHER)
Megasceryle torquata

36 cm.

Confiado. Se zambulle desde ramas en el agua para pescar. Vuelo rápido y ondulante sobre la superficie del agua. Se observa también sobre cables y puentes. Vocalización fuerte como "matraca" en vuelo. Macho: pecho y abdomen pardo rojizo. Juvenil: similar a la hembra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Carpintero gigante
(MAGELLANIC WOODPECKER)
Campephilus magellanicus

36 cm.

Trepa por troncos de árboles. Picoteos fuertes y resonantes. Vuelo ondulante de un árbol al otro. De aspecto grande y fuerte. Macho con cabeza roja. Juvenil similar a la hembra pero con manchas rojas en la cabeza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Remoliner araucana
(DARK-BELLIED CINCLODES)
Cinclodes patagonicus

18 cm.

Confianza. Recorre las orillas en busca de alimento. A veces mueve la cola nerviosamente. En la época reproductiva eriza la corona, levanta las alas y canta. También come moluscos. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Colilarga
(DESMURS WIRETAIL)
Sylviorthorhynchus desmursii

22 cm.

Muy activa. Solitaria. Difícil de ver pero confiada. Oculta en la vegetación densa. Vuela bajo de un arbusto a otro. La cola (15 cm) es el doble de la longitud de su cuerpo (7 cm) Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Tintica o rayadito
(THORN-TAILED RAYADITO)
Aphrastura spinicauda

14 cm.

Confiado. Inquieto y acrobático. Recorre los árboles en grupos, revisando las hojas y la corteza. A veces junto al picolezna. Metálica vocalización a coro. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña



Picolezna patagónica
(WHITE-THROATED TREERUNNER)
Pygarrhichas abogularis

15 cm.

Trepa en forma oblicua o circular los troncos y ramas buscando insectos y otros invertebrados debajo de las cortezas. Solo o en parejas, a veces junto a rayaditos. Vocalización metálica como el rayadito pero menos aguda. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Canastero coludo
(LESSER CANASTERO)
Asthenes pyrrholeuca

15 cm.

Tímido. Vuela bajo entre los arbustos para alimentarse. Oculto entre la vegetación pero se puede detectar su presencia porque emite un agudo "uii-iii". Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Huet huet
(BLACK-THROATED HUET-HUET)
Pteroptochos tami

22 cm.

Curioso. Parece una "gallinita". Solo o en parejas. Terrestre. Escarba el suelo y la hojarasca. Vocalización "huet-huet" y otros gritos fuertes y potentes. Cola erecta. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Chucaco
(CHUCO TAPACULO)
Scelorchilus rubecula

17 cm.

Confiado y muy curioso. Solitario. Terrestre. Camina y escarba el suelo y la hojarasca. También se posa en ramas y troncos caídos. Asociado a cañaverales y sectores de vegetación densa igual que el huet huet. Fuerte y variada vocalización. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Gaucho serrano
(BLACK-BILLED SHRIKE-TYRANT)
Agriornis montana

21 cm.

Confiado (puede visitar canastas y manteles de picnic para alimentarse de restos de comida). Solitario y bastante terrestre. En invierno se puede observar en grupos. También se alimenta de lagartijas. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Fio fio silbón
(WHITE-CRESTED ELAENIA)
Elaenia albiceps

13 cm.

Confiado. Solitario, pero a veces en grupos pequeños. Se muestra en sitios visibles, incluso en el suelo. Silbido y espaciado "fiio, fiio". Juvenil sin corona blanca. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Tachuri siete colores
(MANY-COLORED RUSH-TYRANT)
Tachuris rubrigastra

10 cm.

Curioso y confiado pero difícil de observar. Solitario y oculto entre los juncales. Hace vuelos cortos al ras del agua, entre la vegetación. Muy pequeño. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Cachudito pico negro
(TUFTED TIT-TYRANT)
Anairetes parulus

10 cm.

Confiado e inquieto, recorre arbustos y árboles. Solitario o en pareja. Vuelo corto y ondulante. Vocalización corta y repetitiva: "rrrrrr" que realiza con frecuencia. Muy pequeño. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Diucón
(FIRE-EYED DIUCÓN)
Xolmis pyrope

19 cm.

Pasivo y muy confiado. Solitario, en otoño los juveniles forman pequeños grupos. Se posa en sitios visibles sobre árboles, alambrados y postes. Picotea ventanas y espejos de autos. Caza insectos con vuelos rápidos y cortos. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Rara
(RUFIOUS-TAILED PLANTCUTTER)
Phytotoma rara

18 cm.

Solitario o en pareja. Se posa sobre ramas altas de arbustos. Pico aserrado que usa para cortar brotes, hojas y frutos. También se alimenta en el suelo de hierbas. Ambos sexos con ojos rojos. Hembra estriada y menos colorida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Golondrina patagónica
(PATAGONIAN SWALLOW)
Tachycineta meyeni

13 cm.

Vuela rápido en forma errática. Se posa en ramas altas de los árboles y en cables. Se alimenta volando al ras del agua. Su mancha blanca (en vista dorsal) la diferencia de la golondrina barranquera que también vive en el Parque Nacional. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Zorzal patagónico
(AUSTRAL THRUSH)
Turdus falcklandii

24 cm.

Eleva la cola al posarse. A veces con las alas caídas. Camina y hace "carreteras". Vuelo ondulante y rápido. En otoño e invierno forma grupos. Agradable canto. Macho y hembra con leve dimorfismo sexual (hembra colores más pardos y cabeza más pálida). Juvenil con el pecho moteado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Ratona o chercán
(HOUSE WREN)
Troglodytes aedon

10 cm.

Inquieta y bulliciosa. Solo o en pareja. Busca alimento recorriendo y trepando arbustos, cercos y a veces el suelo. Vuelo muy corto y bajo. Nidifica con frecuencia en techos y viviendas. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña



Yal andino
(YELLOW-BRIDLED FINCH)
Melanoderes xanthogramma

15 cm.

Confiado y terrestre. Silencioso. En parejas o pequeñas bandadas. Recorre roquedales y también frecuente refugios de montaña donde se alimenta de restos de comida. Hembra: estriada de pardo oscuro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Comesebo patagónico
(PLUMBEOUS SIERRA-FINCH)
Phrygillus patagonicus

14 cm.

Inquieto y confiado. Se alimenta tanto en el suelo como en árboles y arbustos. En otoño e invierno forma bandadas. Vocalización como chasquido y melodiosa en primavera/verano. Hembra similar al macho, pero con tonos de coloración más apagada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Yal plumizo
(AUSTRAL BLACKBIRD)
Phrygillus unicolor

13 cm.

Confiado y silencioso. Bastante terrestre, se posa en rocas y en el suelo donde se alimenta. El macho es gris uniforme. La hembra estriada de pardo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Chingolo
(RUFIOUS-COLLARED SPARROW)
Zonotrichia capensis

12 cm.

Confiado. Se alimenta en el suelo. En otoño e invierno forma bandadas con otras especies. Distintivo canto, muy agradable. Juvenil: pardo grisáceo estriado de oscuro. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Loica común
(LONG-TAILED MEADOWLARK)
Sturnella loyca

22 cm.

Vuela en grupos, a veces muy numerosos. Se posa en arbustos y postes, pero se alimenta en el suelo escarbando la vegetación. Canta en sitios visibles. Hembra: Menos colorida y más estriada que el macho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Tordo patagónico
(AUSTRAL BLACKBIRD)
Curaeus curaeus

26 cm.

Curioso. Solitario o en grupos que se desplazan de un árbol a otro. No asociado al ganado. Se posa en lugares visibles. Se alimenta en el suelo escarbando la vegetación pero también en los árboles. Canto variado y agradable. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Cabecitanegra austral
(BLACK-CHINNED SISKIN)
Carduelis barbata

12 cm.

Inquieto y confiado. En otoño e invierno forman bandadas muy numerosas que recorren las copas de los árboles, los cardales y los pastos para alimentarse. También come en el suelo. Canto variado y agradable incluso cuando vuela. Macho: corona y garganta negra. Hembra: corona y garganta oliváceo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Algunas recomendaciones:

- Evite hacer ruidos molestos que puedan ahuyentar a las aves.
- No tirar basura ni modificar la vegetación de las costas.
- No ingresar al Parque Nacional con mascotas.

Código de conducta del Observador de Aves (Aves Argentinas/AOP)

- 1- La preservación de las aves está antes que el placer del observador: evite molestarlas en particular cuando están en época reproductiva.
- 2- Conozca las leyes locales y la idiosincrasia de los lugareños y respételos.
- 3- Contribuya al conocimiento de las aves compartiendo sus registros.
- 4- Tenga especial cuidado con lo relacionado con aves raras y amenazadas.
- 5- Sea un embajador de la observación de aves.

COA'S (Clubes de Observadores de Aves)

Si quiere empezar a observar aves puede comunicarse con los Clubes de Observadores de Aves (COA), de Villa Traful, Villa La Angostura y Bariloche.



"Si lo ves avisanos"

Tu registro colabora con el Parque Nacional Nahuel Huapi y nos ayuda a conocer mejor a las especies más amenazadas y a las menos conocidas.

sib@apn.gov.ar / drpn@apn.gov.ar / conservacionnh@apn.gov.ar

