árboles

Alerce
Fitzroya cupressoides

Hasta 40 m.

Corteza castaño rojiza, muy esponjosa, hendida longitudinalmente. Hojas simples perennes, con forma de escama, dispuestas de a tres. Flores masculinas cilíndricas, las femeninas son conos globosos. Semillas pequeñas, con 2 ó 3 alitas que les permiten ser diseminadas por el viento.

Lenga
Nothofagus pumilio

Hasta 30 m.

Varía de tamaño y aspecto según clima y altitud. Hojas redondeadas de borde dentado varían al rojo en otoño y caen en invierno. Flores masculinas solitarias con 15 a 20 estambres; las femeninas solitarias con pequeñas escamas en la base. Fruto pequeño conteniendo una nuececita alada.

Radal
Lomatia hirsuta

Hasta 10 m.

Puede tener varios tallos, copa globosa, hojas simples y coriáceas de forma redondeada, anchas y grandes, verde oscuro brillante, de bordes aserrados. Flores blanco cremoso, en racimos.

Arrayán
Luma apiculata

Hasta 15 m.

Siempreverde, con ramas retorcidas, de corteza lisa color canela y manchas blancuzcas. Hojas coriáceas, opuestas, aovadas, terminadas en punta. Flores blancas con estambres numerosos y salientes. Fruto comestible.

Maitén
Maytenus boaria

Hasta 25 m.

Follaje frondoso, ramas delgadas, largas y colgantes. Corteza gris algo agrietada. Hojas con borde aserrado, alargadas, verde claro. De rápido crecimiento. Flores pequeñas amarillo verdosas. Fruto cápsula con 1 o 2 semillas rojas.

Maniú macho
Podocarpus nubigenus

Hasta 20 m.

Tronco de hasta 30 cm de diámetro. Hojas lineales de 4 cm de largo con extremo rígido y punzante, verde amarillento la cara superior y la inferior más clara con dos bandas blanquecinas. Fruto carnoso de color rojo, tiene en la punta una semilla ovoide.



Ciprés de la cordillera
Austrocedrus chilensis

Hasta 25 m.

Copa cónica, tronco recto y corteza grisácea algo rugosa. Hojas con forma de escamas en ramitas aplandas. Flores masculinas cilíndricas y femeninas agrupadas en conos ovoides. Semillas aladas.

Notro
Embothrium coccineum

Hasta 5 m.

Pequeño e irregular. Hojas simples de forma y tamaño variables con borde entero, verdes en la cara superior y blanquecinas en la inferior. Flores rojo brillante, asimétricas, en racimos. Fruto leñoso de 2 valvas con abundantes semillas aladas.

Maniú hembra
Saxegothaea conspicua

Hasta 20 m.

Siempreverde y muy ramificado desde abajo, corteza de placas castaño-rojiza. Hojas pequeñas, angostas, lineales y oblongas, verde amarillento en la cara superior y más claras en la inferior. Flores masculinas ovoides, las femeninas son conos globosos. Fruto leñoso, amarillento, con semillas ovoides.

Coihue
Nothofagus dombeyi

Hasta 40 m.

Siempreverde, con troncos de hasta 2 m de diámetro. Hojas perennes, alternas, coriáceas, lanceoladas con borde aserrado. Flores masculinas en inflorescencias, las femeninas agrupadas de a 3 en una envoltura común. Fruto pequeña cúpula con 3 nuececitas.

Ñire
Nothofagus antarctica

Hasta 15 m.

Corteza rugosa y ramitas nuevas con pubescencia. Hojas alternas, aovadas, caedizas de borde desigualmente aserrado o lobulado. Flores masculinas axilares y solitarias con estambres salientes; las femeninas son cúpulas de 4 valvas rodeadas de escamas rojizas. Frutos formados por 3 nuececitas.



Ciprés de las Guaitecas
Pilgerodendron uviferum

Hasta 40 m.

Copa estrecha simétrica y piramidal, de corteza rugosa castaño-rojiza. Hojas escamiformes dispuestas en forma opuesta. Flores masculinas cilíndricas. Conos femeninos ovoides, grisáceos, con semillas aladas.

exóticas

Especies introducidas, fuera de su área de distribución natural.

Rosa Mosqueta
Rosa rubiginosa

Hasta 2 m.

Arbusto espinoso naturalizado en el oeste de Argentina. Sus frutos ricos en vitamina C se usan para infusiones y mermeladas. Con el aceite de sus semillas se fabrican cremas y lociones.



Retama
Cytissus scoparius

Hasta 2 m.

Arbusto con ramitas angulosas, hojas superiores simples e inferiores con tres folíolos, flores solitarias. Fruto legumbre, de hasta 7 cm. de longitud, color negro, con varias semillas.

Pino Oregón
Pseudotsuga menziesii

Hasta 35 m.

Conífera con troncos de 1,5 a 2 m. de diámetro. Corteza delgada, suave y gris, con numerosas ampollas resiníferas. Hojas dispuestas en espiral, aciculadas, hasta 3,5 cm de largo. Conos maduros femeninos pendulares.

Referencias

- Selva Valdiviana
- Bosque Húmedo
- Bosque de Transición
- Alto Andino
- Estepa

Altura máxima de la planta, expresada en metros.

FOTOS
Javier Grosfeld: 1|2|3|4|6 Pablo Naim: 5

Árboles, arbustos y hierbas del Parque Nacional Nahuel Huapi

En la extensa superficie que comprende el Parque Nacional Nahuel Huapi las especies de plantas de la patagonia conforman distintos tipos de vegetación. Así, la vida del bosque se funde con la estepa y el resultado es una transición entre los ambientes húmedos y verdes y la dorada ondulación de los pastizales; es el bosque de transición. Y en las alturas de cerros y montañas habita una variada flora con características particulares.
Considerando que existe una alta diversidad de plantas en la patagonia, elegimos aquellas especies más comunes y fáciles de ver en el Parque.
Clasificamos a las plantas en leñosas y herbáceas, y dentro de las primeras distinguimos árboles y arbustos.

Cuando usted visita el Parque Nacional está ingresando a un área agreste bajo su propia responsabilidad.
Por su seguridad, evite riesgos y disfrute de su estadía.

Parque Nacional Nahuel Huapi
Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi
San Martín 24 - R8400ALN - S.C. de Bariloche - Argentina
Tel.:(0294) 4423111 / 366

Departamento Conservación y Educación Ambiental
División Educación Ambiental - P.N.N.H. noviembre 2016
Diseño Gráfico: Demián Belmonte / Horacio Grandio

APN

Parque Nacional Nahuel Huapi

Administración de Parques Nacionales

Flora nativa

arbustos

Calafate
Berberis microphylla

Hasta 1,5 m.

Muy ramificado, con espinas tripartitas en las axilas. Hojas enteras, con extremo punzante, color verde oscuro. Flores solitarias amarillo anaranjado, fruto baya globosa de color azul oscuro, carnoso y de pulpa agridulce.

Laura
Schinus patagonica

Hasta 2 m.

Arbusto siempreverde de tronco muy ramificado, de ramas rojizas y hojas verde claro. Flores amarillentas en racimos axilares. Fruto globoso de color lila conteniendo minúsculas semillas.

Romerillo
Chiliotrichum rosmarinifollium

Hasta 1 m.

Hojas alternas, lineares, coriáceas, verde oscuro, lustrosas en la parte superior y blancuzco en la inferior. Flores marginales blancas y las del disco amarillas tubulosas.

Michay
Berberis darwinii

Hasta 2,5 m.

De follaje persistente, muy ramificado, con espinas pequeñas. Hojas alternas de forma romboidal, brevemente pecioladas, con pocos dientes espinosos en el margen. Flores anaranjadas reunidas en racimos sobre cortas ramas laterales. El fruto es una baya color negro azulado.

Maqui
Aristotelia chilensis

Hasta 2 m.

De tronco dividido, ramas delgadas y flexibles. Corteza lisa, clara, que se desprende en tiras. Hojas semideciduas alargadas, de borde aserrado, color verde brillante. Flores pequeñas, en racimos, amarillentas. Frutos bayas pequeñas negro brillante.

Palo piche
Fabiana imbricata

Hasta 3 m.

Arbusto muy ramificado con ramas cubiertas por pequeñísimas hojas en forma de escamas. Flores tubulares blancas o violáceas, solitarias en el extremo de ramitas axilares o terminales. Fruto cápsula que se abre en cuatro dientes con numerosas semillas reniformes.

Caña colihue
Chusquea culeou

Hasta 6 m.

Macizas, sin ramificaciones, erguidas o arqueadas, de 2 a 5 cm de diámetro. Hojas rígidas, lanceoladas que nacen en los nudos. Flores violáceas agrupadas en racimos densos. Fruto con una sola semilla. La floración es en verano. Florece cada 40 o 60 años, y luego la planta muere.

Pañil
Buddleja globosa

Hasta 4 m.

Muy ramificado, con ramas estriadas cubiertas de vello blanquecino. Hojas opuestas, de hasta 20 cm de largo, verde oscuro en la cara superior y grisáceo en la inferior debido a presencia de pelos. Flores amarillo oscuro. Fruto cápsula con diminutas semillas.

Chacay de la cordillera
Discaria chacaye

Hasta 3 m.

Arbusto o arbolito muy ramificado, follaje verde oscuro, brillante, ramas espinescentes. Hojas opuestas, aovadas. Flores blancas reunidas en fascículos axilares. Fruto tricoco.



Chilco o Aljaba
Fuchsia magellanica

Hasta 2 m.

Arbusto de ramas delgadas, largas y frágiles. Hojas lanceoladas, de borde aserrado, verde más claro en la cara inferior y nervaduras rojizas. Flores solitarias colgantes color rojo fucsia. Fruto baya alargada, negra y carnosa, conteniendo muchas semillas.

Retamo
Diostea juncea

Hasta 5 m.

Ramas largas, verdes y erguidas con entrenudos extensos. Pocas hojas enteras o aserradas, alargadas de hasta 2, 5 cm de largo. Flores alargadas en espigas color blanco violáceo.

Neneo
Mulinum spinosum

Hasta 1 m.

Subarbusto, globoso, muy ramificado. Hojas alternas, teminadas en tres o cinco segmentos punzantes. Flores unisexuales, amarillas, con 5 pétalos, en umbelas que sobresalen del follaje. Frutos amarillo rojizo, alados.

herbáceas

Cortadera
Cortaderia araucana

Hasta 2 m.

Gramínea de gran tamaño. Hojas acintadas, largas, verde oscuro. Grandes inflorescencias, blanquecinas y plumosas.

Lágrima de arroyo
Ourisia ruelloides

Hasta 0,20 m.

Hierba perenne, rastrera. Hojas opuestas, pecioladas, pubescentes, redondeadas, con borde crenado o aserrado. Flores rojas tubulares, en racimos terminales. Fruto cápsula con semillas pequeñas y alargadas. En arroyos de montaña.

enredaderas

Reina Mora
Mutisia spinosa

Trepadora, flores rosadas. La decocción de las raíces se emplea para hacer crecer el cabello.



Topa topa
Calceolaria palenae.

Hasta 0,40 m.

Hierba perenne de hojas arrosetadas, redondeadas. Flores globosas en grupos de 4 o 5, pedúnculos rojizos. Fruto cápsula bivalva castaño verdoso con numerosas semillas pequeñas.

Flor de papel
Armeria maritima

Hasta 0,20 m.

Hierba perenne, rizomatosa, hojas delgadas y finas, agrupadas en rosetas, color verde oscuro. Flores color crema a rosa en cabezuelas.

Mutisia
Mutisia decurrens

Trepadora, flores anaranjadas.Se utiliza contra los dolores reumáticos.

hemiparásitas

Viven sobre otras plantas, de las que succionan la savia bruta que luego elaboran porque poseen clorofila.

Amancay
Alstroemeria aurea

Hasta 1 m.

Planta rizomatosa de hojas lanceoladas con varias nervaduras longitudinales. Flores amarillas o anaranjadas, con manchas rojas, en inflorescencias terminales. Fruto cápsula conteniendo varias semillas anaranjadas.

Arvejilla
Lathyrus magellanicus

Hasta 1,50 m.

Planta herbácea, trepadora. Hojas compuestas de 2 folíolos alargados de hasta 10 cm de largo con nervaduras longitudinales. Zarzillos ramificados. Flores color violeta en racimos axilares. Vaina negra con semillas.

Quintral
Tristerix corymbosus

Hasta 1 m.

Arbusto carnoso, de hojas opuestas brevemente pecioladas, verde oscuro. Flores rojas terminales. Fruto carnoso. Se lo encuentra adherido a ramas de árboles y arbustos. En medicina popular se utiliza como astringente.

Nalca
Gunnera tinctoria

Hasta 1,5 m.

Hierba gigante, perenne, rizomatosa. Hojas verde oscuro, palmatilobuladas de hasta 1 m de diámetro, ásperas, pubescentes, sostenidas por gruesos pecíolos carnosos. Flores muy pequeñas en largas y densas inflorescencias.

Vinagrillo
Oxalis valdiviensis

Hasta 0,25 m.

Planta casi sin tallo, perenne, con raíz leñosa. Hojas trifoliadas, largamente pecioladas. Flores amarillas con forma de embudo, dispuestas en racimos terminales.

Misodendro
Misodendrum punctulatum

Hasta 0,50 m.

Subarbusto sin hojas, vive sobre las ramas de los Nothofagus, ramitas cubiertas de pequeños tubérculos. Flores femeninas y masculinas separadas. Fruto aquenio provisto de tres setas plumosas.